


# Hvordan **Ventizolve**<sup>®</sup> bruges i tilfælde af en overdosis



# Ventizolves virkning og anvendelse

**Ventizolve® anvendes til at ophæve virkningen af kendt eller mistænkt opioidoverdosis hos voksne (f.eks. morfin, heroin, metadon, fentanyl, oxycodon eller buprenorphin), især hos personer med risiko for abstinenssymptomer.**

Ventizolve® er en næsespray, der anvendes til akut behandling af opioidoverdosis eller mulig opioidoverdosis hos voksne. Tegn på overdosis omfatter:

- vejrtrækningsproblemer
- svær søvnighed
- ingen reaktion på høj lyd eller berøring.

**Hvis du har risiko for at få en opioidoverdosis, skal du altid have Ventizolve® på dig.**

Ventizolve® virker i kort tid og alene for at ophæve virkningen af opioider, mens du venter på lægehjælp. Det er ikke en erstatning for akut lægehjælp.

Fortæl altid din familie og venner, at du har Ventizolve® på dig.

# Advarsler og forsigtighedsregler

**Dette lægemiddel anvendes til akut behandling af opioidoverdosis og skal gives af en anden end dig selv.**

**Ventizolve® skal gives med det samme og erstatter ikke akut lægehjælp.**

**Ring efter en ambulance med det samme, også selvom personen vågner op.  
RING 112.**

**Én næsespray med Ventizolve® indeholder kun én dosis af naloxon.**

Det er vigtigt, at næsesprayen ikke primes eller testes for brug, da dette vil tømme næsesprayen og du ikke vil modtage det lægemiddel, du har brug for. Brug den næste Ventizolve® næsespray hvis det er nødvendigt med flere doser. Yderligere doser kan gives 2 til 3 minutter efter den første dosis.

# Brugsvejledning

1

## Tjek symptomer og reaktion

• **Tjek for reaktion for at se, om personen er ved bevidsthed.** Du kan råbe personens navn, forsigtigt ruske i skuldrene, tale højt ind i øret, gnide på brystbenet (sternum), knibe øret eller kanten af fingerne.

## • Tjek luftveje og åndedræt.

Sørg for at mund og næse ikke er blokeret. Overvåg åndedrættet i 10 sekunder – bevæger brystkassen sig? Kan du høre åndedrættet? Kan du føle åndedrættet mod din kind?

• **Tjek tegn på overdosis**, såsom: ingen reaktion på berøring eller lyde, langsom uregelmæssig vejrtrækning eller ingen vejrtrækning, snorken, gispem eller synkebevægelser, blå eller lilla farve på fingernegle eller læber.

**Hvis overdosis mistænkes, skal Ventizolve® gives.**


2

Ring efter en ambulance.  
RING 112.



3

Læg patienten på ryggen. Sørg for at luftvejene er frie. Det anbefales at undersøge næseboret og fjerne eventuel tilstopning, før næsesprayen gives.




4

Åbn den indre emballage ved først at fjerne gummibåndet og derefter trykke på midten af de flade sider af plastikdelen.




5

Støt nakken idet hovedet lænes tilbage. Indsæt dysen i det ene næsebor. Tryk kraftigt ned på stemplet, indtil det siger klik, for at afgive dosis. Fjern derefter næsesprayen fra næseboret.




6

Læg patienten i aflåst sideleje. Bliv hos patienten indtil ambulancen ankommer. Se efter forbedring i patientens vejrtrækning, opmærksomhed og reaktion på støj og berøring.



7

Hvis der ikke ses forbedring, skal næste dosis gives efter 2-3 minutter i det andet næsebor.



## Husk

- Tiden er vigtig! Tøv ikke med at yde førstehjælp og med at bruge Ventizolve®
- Start altid med at sikre frie luftveje og ring efter en ambulance
- Du kan ikke skade en person ved at give dem Ventizolve® næsespray
- Der er ingen risiko for, at du skader dig selv ved at give næsesprayen til en anden person
- Indeni hver plastbeholder er der en hurtig startvejledning.

For mere information besøg  
[www.dk.ventizolve.com](http://www.dk.ventizolve.com)  
eller scan QR koden



002/v01/DK